

Subvert®

Tecnología exclusiva de feromona líquida microencapsulada para el control de *Lobesia botrana*.

Suterra®
Subvert®



Uva de mesa y uva de vinificación



Polilla del Racimo
(*Lobesia botrana*)

Conoce Subvert®

Es la feromona líquida de Suterra® para controlar la polilla del racimo en tu viñedo. Una nueva tecnología que llega para revolucionar el control de plagas agrícolas.

Innovación

Tecnología exclusiva de microencapsulado.
Acción prolongada de hasta 4 semanas.
Adecuado para cualquier volumen de caldo.
Facilidad de uso en el tanque de mezcla.

Calidad

Reduce el uso de tratamientos insecticidas y antibottríticos.
Aplicación flexible para adaptarse a las necesidades del agricultor.
Aplicación superficial sin necesidad de mojar el interior del racimo.

Sostenibilidad

Sin residuos al inicio de cosecha.
Combate la resistencia a insecticidas.
Aliado de polinizadores y enemigos naturales.
Indispensable en estrategias de gestión integrada de plagas.



Protección de 4 semanas



Microencapsulado de precisión




Aplicación flexible



Eficaz sin contacto



Aplicación sencilla




Nº Registro
ES-01233

Dosis recomendada
75 ml/ha - 3 semanas
110 ml/ha - 4 semanas

Unidad de venta
1 botella | 450 ml
1 caja | 6 botellas

Condiciones de almacenamiento: Proteger de la luz solar, conservar en lugar fresco y oscuro. Caducidad: Aplicar antes de 2 años desde la fecha de fabricación.



Subvert®

Tecnología exclusiva de feromona líquida microencapsulada para el control de *Lobesia botrana*.



La revolución contra la Lobesia


Subvert® permite un uso flexible adaptado a las necesidades de cada agricultor. Puede aplicarse puntualmente en función de la evolución de la plaga. Es idóneo para el control de generaciones estivales (2ª generación) y de generaciones cercanas a vendimia (3ª/4ª generación).

¿Cuándo aplicar Subvert®?


Se recomienda aplicar Subvert® al inicio de la 2ª y/o 3ª/4ª generación de Lobesia.

El control de la 2ª generación es clave para controlar la *Lobesia botrana* y evitar daños.


El control de la 3ª/4ª generación es principalmente para proteger las variedades tardías.




Recomendaciones de aplicación



Agitar enérgicamente




75 ml/ha para 3 sem. de acción
110 ml/ha para 4 sem. de acción



Verter en el depósito del pulverizador

Video aplicación



- No es necesario mojar el interior del racimo.
- No es necesario dirigir las boquillas de pulverización hacia el racimo.
- Se pueden realizar tratamientos a muy bajo volumen o saltándose calles.
- Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la aplicación.

